

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM

Excize či extirpace (chirurgické odstranění kožního útvaru)

V předkládaném formuláři si přečtete informace o excizi či extirpaci patologického útvaru. Pomohou vám připravit se na rozhovor s lékařem, který vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Excize či extirpace je odstranění patologického útvaru kůže, podkoží nebo na sliznici.

Důvodem tohoto výkonu je odstranění patologického útvaru z různých oblastí lidského těla:

- povrchově uložených útvarů – nejčastěji se jedná o různé druhy kožních nádorků (basaliomy, spinaliomy, veruky apod.),
- útvary podkožní tkáně – jedná se o ateromy, lipomy, fibromy, lipofibromy,
- hlouběji uložené útvary – zvětšené či jinak změněné lymfatické uzliny, vrozené patologické útvary (cysty, atd.).

V případě, že užíváte léky ovlivňující srážení krve (Anopyrin, Godasal, Stacyl, Plavix, Trombex, Warfarin, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Prasugrel, Brilique, Noclaud, Pladizol, Claudienne apod.) je nutné jejich vysazení před výkonem konzultovat jak s ošetřujícím lékařem, tak se specialistou, který je nasadil. Obvykle se vysazují 2 – 7 dní před zákrokem dle typu užívaného léku.

Operace se provádí v místním znecitlivění (pokud víte, že máte alergii na Mesocain, oznamte tuto informaci ošetřujícímu lékaři). Po aplikaci anestezie se patologický útvar běžnými operačními technikami odnímá a odesílá na histologii, kde se podrobí mikroskopickému vyšetření patologem. Rozbor nálezu trvá zpravidla 7-14 dní. Následuje sešití rány.

Jako každý operační výkon má i tento své komplikace. Níže uvedené nejsou příliš časté, nicméně naprostou bezrizikovitost jakéhokoliv léčebného zákroku není možné nikdy zaručit. Mezi nejčastější komplikace patří:

- časně krvácení (do 24 hodin po výkonu)
- pozdní krvácení (do 10-14 dnů po operaci)
- špatné hojení rány
- vznik keloidní (navalité) jizvy
- zánětlivé komplikace
- recidiva (opakování)

Případné komplikace po výkonu jsou v režii ošetřujícího lékaře, případně pohotovosti. V některých případech se v pooperačním průběhu k prevenci zánětlivých komplikací nasazují antibiotika. Rána je pravidelně převazována a dezinfikována. Další léčba závisí na výsledku histologického vyšetření.

Souhlas pacienta/pacientky s výkonem

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta/pacientky:

.....

Rodné číslo pacienta/pacientky:

.....

V Ostravě dne:

Podpis pacienta/pacientky nebo zákonného zástupce:

.....

Podpis a razítko lékaře: